

# RELACHEMENT DU MUSCLE UTERIN EN PERIPARTUM : PREPARATION ET POSOLOGIES DU NITRONAL SELON LES INDICATIONS

## PREPARATION DE LA SERINGUE :

Une ampoule = 5 mg de nitronal dans une seringue de 20 ml soit 0,25 mg/ml ou 250 µg /ml.

## POSOLOGIES A ADMINISTRER :

Administrer la dose suivante de nitronal, à renouveler si l'efficacité est insuffisante à 2 minutes.

INDICATIONS	Hypertonie utérine, Rétention placentaire	Rétention tête dernière sur siège, Version par manœuvre interne sur J 2 transverse Rétraction per-césarienne sur transverse ou laparoschisis
poso/poids	~ 5 µg/kg	~ 10 µg/kg
50-69 kg	1 ml = 250 µg	2 ml = 500 µg
70-99 kg	2 ml = 500 µg	4 ml = 1000 µg
100-125 kg	3 ml = 750 µg	5 ml = 1250 µg
126-150 kg	4 ml = 1000 µg	6 ml = 1500 µg

## CONDITIONS DE CONTROLE DE LA BAISSSE DE PRESSION ARTERIELLE :

- Dans les situations prévisibles : Remplissage Ringer
- Sur rétention placentaire : Remplissage: Voluven
- Traitement d'une chute de la PA de plus de 25 % : Ephédrine 3mg I.V., renouvelable.

## CONDITIONS DE CONTROLE DE L'HEMORRAGIE :

- Syntocinon systématique = 5 U en I.V. après la naissance de l'enfant ou la RU
- Si insuffisant, suivre le protocole hémorragie de la délivrance.